GRANDES CULTURES

Bulletin nº 22 du 9 décembre 1993

Colza: - Bilan phytosanitaire 92/93.

- Comptage de larves.

Avertissements Agricoles par fax.

Réunion du 11 janvier.

Malgré différents problèmes sanitaires durant la campagne, les rendements moyens du colza d'hiver restent élevés pour la récolte 1993 avec une moyenne régionale de 35 q/ha.

Evolution de la végétation et suivi parasitaire A l'automne

Les pluies de début septembre permettent une bonne levée des colzas, mais également une recrudescence de l'activité des limaces. Les dégâts peuvent être importants dans certains secteurs, entraînant des manques à la levée. Mais ce phénomène est également observé dans des parcelles ayant été semées avec des lots de semences dont le pouvoir germinatif est réduit.

Les altises et les mouches du chou sont restées relativement discrètes. Comme c'est le cas depuis plusieurs années, les traitements spécifiques ont été déconseillés dans la majorité des parcelles.

Les pucerons, à l'automne, sont restés faibles, voire absents dans de nombreuses parcelles. Peu de traitements spécifiques ont été réalisés.

Charançon du bourgeon terminal:

Le vol a démarré le 27 septembre dans le nord de la Moselle et le 2 octobre sur le plateau de Haye. Il se généralise et s'intensifie sur toute la Lorraine durant la première quinzaine d'octobre. Les traitements sont réalisés entre le 10 et le 15 octobre. Les comptages réalisés en début d'hiver montrent une présence importante de larves dans les parcelles non traitées.

Au niveau des maladies, quelques dégâts de mildiou freinant le développement de la végétation sont observés vers la fin du mois de septembre. Des macules de Phoma sont présentes sur les plantes dans certaines parcelles. Aucun traitement spécifique n'est conseillé.

Désherbage:

La méconnaissance de la flore présente sur certaines parcelles, des désherbages de pré-levée mal maîtrisés ou absents ont contribué, au printemps, à la coloration blanche, rouge ou bleu des parcelles de colza. Des traitements de rattrapage avec, entre autre, des produits non homologués n'ont pas conduit à de bons résultats.

Au printemps

Le temps froid et les gelées de début mars ont retardé le début des captures de charançon de la tige. Celles-ci sont enregistrées vers la mi-mars dans le sud meusien et le sud de la Meurthe-et-Moselle. Les traitements sont préconisés pour la fin mars.

Les captures de méligèthes sont faibles. Les seuils d'intervention sont rarement atteints.

Des taux d'infestation importants de charançons des siliques sont enregistrés dans certaines parcelles du sud de la Meuse et de la région de Lunéville. Dans les autres secteurs les traitements sont restés peu nombreux.

Pas de pucerons cendrés au printemps.

P374



SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

38, rue Sainte-Catherine - 54043 NANCY CEDEX - Tél.: 83.30.41.51

:KE - Publication périodique CPPAP N° 2011 AD - Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation - ISSN 0980 - 8507

Imprimerie de la DRAF - Directeur-gérant : D. VERBE

Maladies

A partir de début mars, on a observé des dépérissements de pieds de colza. Le coeur et la partie supérieure du collet ont pourri et ont été rapidement recouverts par les fructifications grises du botrytis. L'attaque a débuté à l'aisselle d'une feuille et s'est propagée à la tige au niveau du point d'insertion de la feuille. Les niveaux d'attaques ont été très variables d'une situation à une autre, allant de quelques pieds isolés à 80 % de plantes touchées, avec un taux d'attaque plus important pour la variété Falcon.

On suppose que la période de gel de fin décembre a permis au botrytis de s'installer sur des blessures de feuilles et qu'ensuite les fortes amplitudes thermiques ont perturbé la physiologie du colza qui n'a pu se défendre contre cette attaque de botrytis. Les conditions météorologiques n'ont pas été favorables aux contaminations de sclérotinia. Les traitements réalisés juste avant la chute des premiers pétales (fin avril) ont permis de couvrir la période à risque. Vu le temps chaud et sec, le renouvellement n'a pas été nécessaire.

A la mi-juin, l'alternaria atteint les siliques dans les quelques secteurs sensibles habituellement touchés. Peu de traitements spécifiques sont réalisés.

Un fort taux de pieds secs avec du Phoma est enregistré à la récolte. Des rendements moyens, assez satisfaisants, laissent présager que ce phénomène n'a eu que peu de conséquences, les pieds touchés n'ayant pas versé.

Comptage de larves

Dès maintenant, réaliser des comptages sur 50 pieds dans toutes vos parcelles.


Intervenir avec un produit huileux, si 60 à 70 % des pieds présentent au moins une larve d'altise ou de charançon du bourgeon terminal.

Attention: Les traitements n'ont qu'une efficacité réduite (60 %) et sont à réaliser avant fin décembre, par température supérieure à 10°C, contre des larves jeunes.

Larves d'altises

Localisation : dans les pétioles.

Caractéristiques : allongée, blanche, avec les deux extrémités noires et trois paires de pattes.



Larves de mouche du chou


Larve de mouche du chou Localisation : le plus souvent au niveau du pivot, parfois dans les pétioles.

Caractéristiques: son stylet à l'avant. Aucune efficacité des traitements sur larve de mouche.

Larves de charançon du bourgeon terminal

Localisation : dans les pétioles et au niveau du bourgeon terminal.

Caractéristiques: Dodues et sans patte, une extrémité noire.



buse all some lessons both of each emphasis at grown and playing the

Larve de charançon du bourgeon terminal

DU NOUVEAU POUR LES AVERTISSEMENTS AGRICOLES

A partir de 1994, le S.R.P.V. LORRAINE vous propose un abonnement d'Avertissements Agricoles différent.

Nouvelle formule:

Les Avertissements Agricoles se partagent en deux types d'informations :

- Générales : biologie, stratégie de lutte, liste des produits, etc...
- Conjoncturelles : données des captures régionales, dates de traitement par secteurs, etc...)

Le S.R.P.V. a décidé d'envoyer ces deux types de message différemment :

- Un classeur comprenant toutes les informations générales, adressé une fois pour toutes au printemps
- Des messages courts vous parvenant en saison, soit par courrier, soit par fax, précisant l'état sanitaire des cultures en Lorraine et renvoyant le plus souvent à l'une ou l'autre page du classeur. Les Avertissements par télécopie pourront être plus adaptés à la microrégion et plus rapides. Ils seront envoyés dans la nuit suivant leur rédaction.

Le tarif et les messages des deux versions seront identiques.

Afin que nous puissions mettre au point cette nouvelle formule, veuillez nous renvoyer le bulletin réponse ci-joint, si vous désirez recevoir les Avertissements par fax (voir aussi page suivante pour achat éventuel d'un télécopieur).

La demande de renouvellement des abonnements pour 1994 paraîtra dans le prochain bulletin.

Bulletin réponse à retourner avant le 20 décembre au S.R.P.V. - 38 rue Sainte Catherine - 54043 NANCY CEDEX si vous désirez recevoir les Avertissements Agricoles, en 1994, par fax

Nom:	Prénom :
Adresse:	
Numéro de téléphone	Numéro de fax (impératif) :
	ouage a solieter un telecopieur
Souhaiterait un abonnement par fax à partir de 1994.	
A	le
	Signature

7378

ACHAT DE TELECOPIEUR

Le S.R.P.V. se propose de vous aider à acquérir votre télécopieur auprès de FRANCE TELECOM. Une commande groupée de plusieurs appareils permettra de négocier une remise allant jusqu'à 10 %.

Si vous désirez profiter de cette remise, nous vous demanderons de nous retourner, avant le 20 décembre, le bulletin réponse ci-dessous, accompagné d'un chèque de caution de 500 F.

Ce chèque ne représente qu'un engagement de votre part, afin que nous puissions nous baser sur un nombre exact d'appareils et négocier une réduction en conséquence.

Dès que nous aurons eu confirmation de la part de FRANCE TELECOM, nous vous préviendrons, afin que vous puissiez acheter l'appareil auprès de votre point accueil FRANCE TELECOM le plus proche de votre domicile.

Nous vous renverrons votre chèque de caution après réception de votre preuve d'achat.

Prix des télécopieurs

Prix HT + TVA 18,6 %	A l'unité De 1 à 3	Achat en nombre de 4 à 9 - 5 %	Achat en nombre de 10 à 49 - 10 %
AGORIS 55	2 500 F	2 375 F	2 250 F

Engagement A retourner avant le 20 décembre au S.R.P.V. - 38, rue Sainte Catherine - 54043 NANCY CEDEX

S.K.1 . V 30, 1	de Sainte Catherine - 54045 NANCI CEDEX	
Nom:	Prénom :	
Adresse:		
Numéro de téléphone :		
S'engage à acheter un télécopieur.		
Ci-joint un chèque de caution de 500 F	rédigé à l'ordre du S.R.P.V.	
	Ale	
	Signature	

LE SERVICE DE LA PROTECTION

DES VEGETAUX

vous invite à participer à une réunion sur le bilan de l'expérimentation "Grandes Cultures"

Le 11 janvier 1994

Centre National de Formation Forestière

Velaine-en-Haye (54) à partir de 10 heures

OP	DB	F	DII	10	UR	
UK	תע	L	$\nu \nu$		-	

10 h - 12 h	: Présentation par M.J. FOTRE MULLER et J.M. TROUP Résultats des essais Grandes Cultures 1993 Protection fongicide blé : Vers une stratégie à un traitement							
12 h - 14 h	:	Repas pris sur place						
14 h - 16 h	:	Présentation par : - Francis MURER, Rapporteur National maladies du feuillage des céréales - Jean-Marie TROUP, SRPV LORRAINE "CLEAN", le modèle d'évolution des maladies des céréales. Application en Lorraine Franziska ZAVAGLI : Laboratoire itinérant, application en Lorraine en 1994.						
Nous comptons	sur vo	otre présence.						
%								
Adresse :								
Assistera à la réu	inion		oui		non			
Réserve un repas (chèque à joindre		staurant (100 F) gatoirement avec l'inscription)	oui		non			
Réserve un documes des la		de synthèse des résultats des es" (100 F)	oui		non			
Ci-joint un chèqu	ue de	F libellé à l	ordre du Se	ervice de la Pr	otection des Vég	gétaux		
Talon à renvoyer	r au S	RPV - 38 rue Sainte Catherine - 540	43 NANCY	CEDEX - av	ant le 31 décem	bre 1993.		

7379